

## **Entendiendo qué es la vasectomía**

### **¿Qué es?**

La vasectomía es un procedimiento de cirugía menor que pone fin a la fertilidad masculina permanentemente.

### **¿Cuál es su mecanismo de acción?**

Se interrumpen los conductos deferentes, con lo cual se impide que los espermatozoides lleguen al exterior; por consiguiente, el semen se eyacula sin espermatozoides.

### **¿Quién puede usar la esterilización masculina?**

Cualquier hombre (pareja) que esté seguro de que no desea tener más hijos y desea protegerse permanentemente contra el embarazo.

### **¿Qué ventajas tiene?**

Entre las principales tenemos:

- Sumamente eficaz.
- Permanente.
- No interfiere con el acto sexual.
- Mayor sensación de placer ya que no existe riesgo de embarazo.
- Fácil de usar.
- Menos riesgo quirúrgico y de bajo costo.

*“Los varones, quienes luego de acceder a una mayor información en la Consejería, previa a la operación, despejan sus mitos y temores en torno a su sexualidad y a su fisiología. Entre ellos: perder su virilidad, volverse impotentes y no tener sensaciones placenteras durante la eyaculación. Sin embargo, sucederá todo lo contrario, sus relaciones serán más placenteras ya que no habrá el temor de un posible embarazo”.*

### **¿Existen algunas desventajas?**

Entre las principales tenemos:

- Eficacia demorada.
- No protege contra las ITS/VIH-SIDA.

### **¿Existe algún efecto secundario?**

Existe la posibilidad de que el paciente pueda sentir alguna molestia menor durante el procedimiento o justo después de la misma.

### **Después del tratamiento, ¿qué hacer?**

Es importante que la persona que haya sido tratada, esté atenta a cualquier signo de complicación. Debe acudir al médico especialista si en cualquier momento después del procedimiento sienta alguna molestia fuerte.

***¿Es importante la consejería?***

Los hombres que deseen someterse a la intervención, deben acudir a consejería en la que le darán a conocer que:

- La vasectomía **NO** surte efecto inmediatamente (Toma por lo menos 12 semanas o 20 eyaculaciones para que los conductos deferentes estén completamente libres de espermatozoides).
- Debe practicarse la abstinencia o usar un método de respaldo, por ejemplo el condón, hasta pasadas las 12 semanas posteriores de la operación.
- Este método **NO PREVIENE** las ITS-VIH/SIDA.

**EN INPPARES CONTAMOS CON PAQUETES PROMOCIONALES EN VASECTOMÍA PARA EL CUIDADO DE SU SALUD POR ESTE MES DE JULIO.**