

DIFERENCIANDO EL PAPANICOLAOU DE LA COLPOSCOPIA

¿Qué es el Papanicolaou? (PAP)

Esta es una prueba sencilla y representa la mejor manera de detectar alteraciones precancerosas o cancerosas de cuello uterino.

¿Cuándo se debe empezar a realizar la prueba de PAP?

- Desde que se comienza a tener relaciones sexuales.

Factores de riesgo en el cáncer de cuello.

Todas las mujeres tienen riesgo de tener cáncer de cuello uterino, especialmente aquellas que:

- Tienen una infección por Papiloma Virus.
- Iniciaron sus relaciones sexuales a temprana edad.
- Tienen varias parejas sexuales, ya sea hombre o mujer.
- Tiene infecciones genitales frecuentemente y que ceden al tratamiento.
- Tiene hábitos de higiene deficientes.
- Fuman en exceso.

Todo Papanicolaou anormal necesita una colposcopia.

¿Qué es la colposcopia?

Es un procedimiento complementario utilizado en los casos de Papanicolaou anormales y falso negativo (discordancia entre lesiones visibles y la citología), evitando biopsias e intervenciones innecesarias.

La colposcopia es un procedimiento moderno que facilita el diagnóstico de lesiones pre-malignas y malignas en el cuello del útero.

INPPARES forma parte de la Coalición Multisectorial Perú contra el Cáncer